





Загальні рекомендації з вирощування

- * Стабільна висока урожайність
- * Відмінна якість
- * Красива шкірка
- * Гарна стійкість до парші
- * Стійкість до потемніння м'якушу



Група стиглості	Середньопізній
Період вегетації	125-140 днів
Товарний урожай*	110-120
Кулінарний тип	В
Форма бульб	Овальна
Розмір бульб	Великі
Колір шкірки	Червоний
Колір м'якушу	Жовтий
Кількість бульб	9-11
Вміст сухих речовин, %	20,6
Період спокою	Середньотривалий
Проростання	Повільне
Чутливість до метрибузину	Середньочутливий
Посухостійкість	Підвищена
Стійкість до синяків	Висока
Стійкість до нематоди	Ro1, Ro4
Стійкість до фітофторозу листя	Підвищена
Стійкість до фітофторозу бульб	Підвищена
Стійкість до парші звичайної	Висока
Стійкість до PVYn	Висока
Стійкість до PVYntn	Підвищена

*днів після посадки

Особливості посадки

Густота посадки (при міжрядді 75 см):

Столова картопля

28/35 - близько 74 тис. бульб/га
35/55 – близько 55 тис. бульб/га

Насіннева картопля

28/35 - близько 90 тис. бульб/га
35/55 – близько 70 тис. бульб/га

Удобрення

Розраховуйте удобрення на основі аналізу ґрунту
Азот

- Столова картопля - 100 кг/га враховуючи запаси в ґрунті
- Насіннева картопля – 90 кг/га враховуючи запаси в ґрунті

Внесення: бажано вносити 100% до посадки.

Не проводьте підживлення азотом.


Уникайте внесення аміачної води і органічних добрив. Це може затримати дозрівання шкірки.

Достатня кількість доступного фосфору забезпечить гарну кількість бульб.

Калій хлористий вносьте не менше ніж за 6 тижнів до посадки.


Забезпечуйте повноцінне живлення по макро- і мікроелементам.

Підготовка до посадки та посадка




- Моцарт має досить довгий період спокою тому рекомендується передсадивне прогрівання та пророщування.
- Не рекомендуємо проводити передпосадкову різку насінневої картоплі.
- Сорт добре переносить посадку в недостатньо прогрітий ґрунт – висаджуйте його одним з перших.
- Контролюйте ріст паростків, оскільки Моцарт чутливий до їх травмування. Уникайте їх обламування.
- Забезпечуйте якісний захист від ризоктонії.
- Уникайте вирощування Моцарту на важких, слабоаерованих ґрунтах де можливе підтоплення.

Особливості вирощування




- Придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів.
- Метрибузин (Зенкор) вносите в рекомендованих дозах до появи сходів. Після сходів використовуйте малі дози.
- Перші фази розвитку досить повільні але потім ріст рослин прискорюється, і бадилля на ґрунті формує гарний листовий екран.
- Своєчасно розпочинайте обробку проти альтернарії та фітофтори.
- Запобігайте зараженню бульб фітофторою.
- Моцарт досить стійкий до посухи, а тому не потребує сильного зрошення.
- Припиняйте зрошення за 3 тижні до десикації або скошування бадилля.

Підготовка до збирання та збирання



- Шкірка Моцарту формується досить довго, тому знищення бадилля проводьте не менше ніж за 3-4 тижні до запланованого збирання. Зауважте, на легких ґрунтах шкірка формується довше.
- При знищенні бадилля - поєднуйте скошування з внесенням десикантів. Забезпечуйте якісне покриття десикантом скошеної рослини.
- Використовуйте лише якісні та ефективні десиканти.
- Налаштовуйте відповідно збиральну техніку та мінімізуйте висоту падіння картоплі.
- Уникайте механічного травмування бульб.
- **Дочекайтеся ПОВНОГО формування шкірки перед збиранням.**
- Материнські бульби можуть погано відділятися від рослин. Ретельно перебирайте картоплю перед зберіганням.

Зберігання



- Бульби сорту добре зберігаються.
- Регулярно вентилуйте бульби.
- Не допускайте коливань температури, що може спричинити конденсат, вихід бульб зі стану спокою та розвиток сріблястої парші.
- Для запобігання розвитку сріблястої парші насінневі бульби обробляйте фунгіцидами.
- Будьте обережними при сортуванні картоплі – уникайте травмувань.
- Витримуйте лікувальний період в 15 днів за температури 15-18°C.
- Після лікувального періоду знижуйте температуру на 0,5-0,7°C на добу до 4°C