

Стандарты (допуски), которые действуют на территории Голландии, в странах ЕС и Украине во время полевого контроля, послеуборочного контроля и контроля партий

Показатель	Требования к качеству								
	НАК				Украина				
	Класс	Допуск, %			Класс	Допуск			
Полевой контроль									
Сортовая чистота	S, SE, E	0				Полесье и Лесостепь	Степь		
					S, SE	0	0		
					E	0	0		
	A	0,01	PH 1,2	3	3				
	C	0,05	PH 3,4	5	5				
Черная ножка	S, SE, E	0			S, SE	0	0		
					E	0,3	0,3		
	A	0,03	PH 1,2	0,5	0,5				
C	0,1	PH 3,4	1,0	1,5					
Вирусы	-	Тяжелая форма мозаики/	Слабая форма мозаики	Всего мозаики	-	Тяжелая форма мозаики/ скручивание листьев	Слабая форма мозаики	Тяжелая форма мозаики/ скручивание листьев	Слабая форма мозаики
	S	0,025	0,025	0,025	S	0,5	2,0	1,0	3,0
	SE	0,05	0,05	0,05	SE	0,5	2,0	1,0	3,0
	E	0,1	0,1	0,1	E	1,0	3,5	1,5	4,5
	A	0,25	2	2	PH 1,2	1,5	6,0	2,5	7,5
	C	2	10	10	PH 3,4	2,0	9,5	3,0	10,0
Послеуборочный контроль									
Вирусы	S	0 на 200			Не определяется				
	SE	1 на 200							
	E	2 на 200							
	A	5 на 100							
	C	10 на 100							
Контроль партий посадочного материала картофеля									
Показатель	Требования НАК для стран ЕС	Требования PD для стран не членов ЕС			Требования ЕС	Класс	Полесье и Лесостепь	Степь	
Мокрая гниль	1 клубень на 250 кг	0%			1% от общего веса партии	S, SE	Не допускается		
						E			
						PH 1,2 PH 3,4			
Черная ножка	Классы SE, S и E – 0 %	0,03 %			2%	S, SE	0,3		
	E					0,3			
	Классы А – 0,03 % Классы С – 0,10 %				0,10 %	4 %	PH 1,2 PH 3,4	0,5	
Фитофтороз	до 35 мм включительно – 1 клубень на 50 кг	0,5% от общей массы ваги			1% от общей массы	S, SE	0,5	0,5	
						E	1,5	1,5	
						PH 1,2 PH 3,4	2,0 4,0		
						PH 3,4	4,0		
	более 35 мм – 1 клубень на 100 кг				1% от общей массы	S, SE	0,5	0,5	
E	1,5	1,5							
PH 1,2 PH 3,4	2,0 4,0								
Сухая гниль	1-4 клубня на 50 кг				1% від загальної ваги	S, SE	0,5	1,0	
						E	0,5	1,0	
						PH 1,2	1,0		
						PH 3,4	1,5		

Парша обыкновенная	Степень парши 2,5 (не более 1/8 от общей площади)	Допустимая степень парши	Максимум у 5% клубней. Общая пораженная поверхность не более 1/3 площади.	S, SE	3,0	5,0
				E	3,0	5,0
				PH 1,2	3,0	
				PH 3,4	5,0	
Ризоктониоз Классы SE та S	10% слабый		Не регламентируется	S, SE	1,0	0,5
Ризоктониоз Классы E-C	25% слабый			E	1,5	1,0
				PH 1,2	1,5	
				PH 3,4	2,0	
Внешние отклонения	4-12 клубней на 50 кг	1% от общей массы	3% от общей массы	S, SE	5,5	7,0
				E	6,0	7,5
				PH 1,2	8,0	
				PH 3,4	10,5	
Загрязнение	1% от общей массы	1% от общей массы	3% от общей массы	S, SE	2,0	2,0
				E	2,0	2,0
				PH 1,2	2,0	
				PH 3,4	2,0	