

**Стандарти (допуски), які діють на території Голландії, в країнах ЄС та України вимоги у ході польового, післязбирального контролю картоплі та контролю партій**

Показник	Вимоги до якості										
	НАК					Україна					
	Клас	Допуск, %			Клас	Допуск					
<b>Польовий контроль</b>											
Сортова чистота	S, SE, E	0				Полісся і Лісостеп	Степ				
					S, SE	0	0				
					E	0	0				
	A	0,01			PH 1,2	3					
	C	0,05			PH 3,4	5					
Чорна ніжка	S, SE, E	0			S, SE	0					
					E	0,3					
	A	0,03			PH 1,2	0,5					
	C	0,1			PH 3,4	1,0					
Віруси	-	Важка форма мозаїки/	Слабка форма мозаїки	Всього мозаїки	-	Важка форма мозаїки/скручування листків	Слабка форма мозаїки	Важка форма мозаїки/скручування листків	Слабка форма мозаїки		
	S	0,025	0,025	0,025	S	0,5	2,0	1,0	3,0		
	SE	0,05	0,05	0,05	SE	0,5	2,0	1,0	3,0		
	E	0,1	0,1	0,1	E	1,0	3,5	1,5	4,5		
	A	0,25	2	2	PH 1,2	1,5	6,0	2,5	7,5		
	C	2	10	10	PH 3,4	2,0	9,5	3,0	10,0		
<b>Післязбиральний контроль</b>											
Віруси	S	0 на 200			<b>Не визначається</b>						
	SE	1 на 200									
	E	2 на 200									
	A	5 на 100									
	C	10 на 100									
<b>Контроль партій садивного матеріалу картоплі</b>											
Показник	Вимоги НАК для країн ЄС	Вимоги PD для країн не членів ЄС			Вимоги ЄС	Клас	Полісся і Лісостеп	Степ			
Мокра гниль	Спорадично (1 бульба на 250 кг)	0%			1% від загальної ваги партії	S, SE	<b>Не допускається</b>				
						E					
						PH 1,2 PH 3,4					
Чорна ніжка	Класи SE, S та E – 0 %	0%			2%	S, SE	0,3				
	Класи A – 0,03 %	0,03 %			4 %	PH 1,2	0,3				

	Класи С – 0,10 %	0,10 %	4 %	РН 3,4	0,5		
Фітофтороз	до 35 мм включно – 1 бульба на 50 кг	0,5% від загальної ваги	1% від загальної ваги	S, SE	0,5		
				E	1,5		
				РН 1,2	2,0		
				РН 3,4	4,0		
	вище 35 мм – 1 бульба на 100 кг		1% від загальної ваги	S, SE	0,5		
				E	1,5		
				РН 1,2	2,0		
				РН 3,4	4,0		
Суша гниль	1-4 бульби на 50 кг	0,5% від загальної ваги	1% від загальної ваги	S, SE	0,5	1,0	
				E	0,5	1,0	
				РН 1,2	1,0		
				РН 3,4	1,5		
Парша звичайна	Ступінь парші 2,5 (не більше 1/8 від загальної площі)	Допустима ступінь парші	Максимум у 5% бульб. Загальна уражена поверхня не більше ніж 1/3 площі.	S, SE	3,0	5,0	
				E	3,0	5,0	
				РН 1,2	3,0		
				РН 3,4	5,0		
Ризиктоніоз Класи SE та S	10% слабкий	10% слабкий	Не регламен тується	S, SE	1,0	0,5	
Ризиктоніоз Класи E-C	25% слабкий	25% слабкий		E	1,5	1,0	
				РН 1,2	1,5		
				РН 3,4	2,0		
Зовнішні аномалії	4-12 бульб на 50 кг	1% від загальної ваги	3% від загальної ваги	S, SE	5,5	7,0	
				E	6,0	7,5	
				РН 1,2	8,0		
				РН 3,4	10,5		
Забруднення	1% від загальної ваги		1% від загальної ваги	3% від загальної ваги	S, SE	2,0	
					E	2,0	
					РН 1,2	2,0	
					РН 3,4	2,0	